

REIMAGINA

LO POSIBLE



 **AVMAPKI® FAKZYNJA® CO-PACK**
(avutometinib capsules; defactinib tablets) 0.8 mg; 200 mg

Avmapki Fakzynja Co-Pack es el primer medicamento con receta autorizado por la FDA específico para personas adultas que tienen cáncer de ovario seroso de evolución lenta (LGSOC) recurrente (es decir, que el cáncer ha regresado) y LGSOC con una mutación anómala del gen *KRAS* y que han recibido tratamiento farmacológico para el cáncer con anterioridad.

Se desconoce si Avmapki Fakzynja Co-Pack es seguro y eficaz en niñas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Avmapki Fakzynja Co-Pack puede causar efectos secundarios serios, como problemas en los ojos, reacciones cutáneas graves, problemas hepáticos y problemas musculares, como rabdomiólisis. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Avmapki Fakzynja Co-Pack. Consulte a su médico para que la asesore sobre los efectos secundarios.

Consulte la información importante de seguridad adicional contenida en este folleto y hable sobre esto con su médico. Haga clic aquí para leer la [Información de receta](#) y la [Información para la paciente en español](#) completas. Haga clic aquí para leer la [Información de receta](#) y la [Información para la paciente en inglés](#) completas.

Hace tiempo que las mujeres que tienen cáncer de ovario seroso de evolución lenta (LGSOC) recurrente con mutación del gen *KRAS* están en busca de una alternativa.

Tradicionalmente, las mujeres con LGSOC recurrente con mutación del gen *KRAS* han tenido opciones de tratamiento limitadas.

Si su LGSOC ha regresado, no está sola.

Más del **80** % de las mujeres con LGSOC presentan recurrencia.

La recurrencia se produce cuando el cáncer vuelve a aparecer después del tratamiento.

Los resultados de las pruebas genéticas pueden ayudar a orientar las decisiones de tratamiento.

La mutación del gen *KRAS* se presenta en alrededor del **30** % de los casos de LGSOC y es el tipo de mutación más frecuente que se observa con el LGSOC.

Una mutación es un cambio en el ADN.

Llegó el momento de REIMAGINAR sus opciones

Avmapki Fakzynja Co-Pack

- Bloquea 2 vías diferentes implicadas en el crecimiento del LGSOC.
- Es un tratamiento oral.



Antes de comenzar el tratamiento con Avmapki Fakzynja Co-Pack

Informe al profesional de la salud sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente:

- Si tiene antecedentes de problemas en los ojos o la visión.
- Si ha tenido reacciones cutáneas graves en la piel.
- Si tiene problemas hepáticos.
- Si está embarazada o planea quedar embarazada. Tenga en cuenta que Avmapki Fakzynja Co-Pack puede dañar al bebé en gestación.

Consulte la información importante de seguridad adicional contenida en este folleto y hable sobre esto con su médico.

 **AVMAPKI® FAKZYNJA® CO-PACK**
(avutometinib capsules; defactinib tablets) 0.8 mg; 200 mg

Antes de comenzar el tratamiento con Avmapki Fakzynja Co-Pack (continuación)

Informe al profesional de la salud sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente (continuación):

Mujeres con posibilidad de quedar embarazadas:

- El profesional de la salud le solicitará que se haga una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con Avmapki Fakzynja Co-Pack.
- Debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante 1 mes después de la última dosis de Avmapki Fakzynja Co-Pack.
- Informe al profesional de la salud de inmediato si queda embarazada o cree que podría estar embarazada mientras recibe el tratamiento con Avmapki Fakzynja Co-Pack.

Hombres con una pareja de sexo femenino con posibilidad de quedar embarazada:

- Debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante 4 meses después de la última dosis de Avmapki Fakzynja Co-Pack.
- Mujeres que están amamantando o planean amamantar. Se desconoce si Avmapki Fakzynja Co-Pack se transmite a la leche materna. No amamante durante el tratamiento ni durante las 2 semanas posteriores a la última dosis de Avmapki Fakzynja Co-Pack.

Informe al profesional de la salud sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Avmapki Fakzynja Co-Pack puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa Avmapki Fakzynja Co-Pack.

Informe a su profesional de la salud si toma alguno de los siguientes medicamentos en particular:

- Inhibidores de la bomba de protones (IBP) y antagonistas de receptores H2.*
- Warfarina (un anticoagulante).



Conozca los medicamentos que toma. Lleve consigo una lista de estos medicamentos para mostrársela al profesional de la salud y al farmacéutico cuando reciba un nuevo medicamento.

*Los IBP y los antagonistas de receptores H2 son medicamentos que reducen la cantidad de ácido que produce el estómago. Ayudan a aliviar síntomas como el reflujo gastroesofágico, la acidez o la indigestión.

REIMAGINA

el potencial de respuesta con Avmapki Fakzynja Co-Pack

La eficacia se evaluó en un estudio que incluyó a 57 mujeres adultas que tenían LGSOC recurrente con mutación del gen *KRAS* que habían recibido tratamiento farmacológico previo para el cáncer.[†]



El **44 %** de las mujeres respondieron al tratamiento, es decir que el tumor se redujo en tamaño[‡] o desapareció.

[‡]En el 40 % de las mujeres, el tamaño del tumor se redujo en un 30 % o más, mientras que en el 3.5 % de las mujeres el tumor desapareció por completo.

Las respuestas de las mujeres oscilaron entre **3 meses y 2.5 años** (31.1 meses).

La mediana de tiempo que tardaron las mujeres en responder al tratamiento fue de 3.7 meses.

El tratamiento con Avmapki Fakzynja Co-Pack dio lugar a **respuestas clínicamente significativas** en mujeres con LGSOC recurrente con mutación del gen *KRAS*.

[†]Las pacientes no podían participar en el estudio si debían someterse a una intervención quirúrgica mayor para extirpar un tumor, si estaban tomando el anticoagulante conocido como "warfarina", si en el transcurso del año anterior habían tenido una afección de la piel que debieron tratar con medicamentos por vía oral o inyecciones, o si tenían un problema en los ojos (como daño previo en la retina, un problema de córnea actual o de larga duración, o antecedentes de glaucoma). Para obtener más información sobre el estudio, consulte la Información de receta o la Información para la paciente completas mediante los enlaces que figuran a continuación.

Consulte la información importante de seguridad adicional contenida en este folleto y hable sobre esto con su médico.

 **AVMAPKI® FAKZYNJA® CO-PACK**
(avutometinib capsules; defactinib tablets) 0.8 mg; 200 mg

Cómo tomar Avmapki Fakzynja Co-Pack



La pauta de administración se basa en un ciclo de 4 semanas.
Avmapki Fakzynja Co-Pack se toma durante **las primeras 3 semanas**.

Tome el medicamento por vía oral (por la boca) de la siguiente manera:

Avmapki



3.2 mg (4 cápsulas) = 1 DOSIS

- En las **semanas 1, 2 y 3**, tome 3.2 mg (4 cápsulas) en el **día 1** y el **día 4**.
- Tome todas las dosis al mismo tiempo **con comida**.
- Trague las cápsulas enteras. No mastique, rompa ni abra las cápsulas.

Fakzynja



200 mg (1 comprimido) = 1 DOSIS

- En las **semanas 1, 2 y 3**, tome 200 mg (1 comprimido) **2 veces al día**.
- Tómelo **con comida**.
- Trague los comprimidos enteros. No mastique, rompa ni triture los comprimidos.

Conserve los medicamentos refrigerados a una temperatura de 2 °C a 8 °C (36 °F a 46 °F) en sus frascos originales.

Semana 4

Tómese un descanso de 1 semana del medicamento.

Con esto habrá completado 1 ciclo de tratamiento.

Las imágenes del producto que se muestran no ilustran el tamaño real.

Consulte la información importante de seguridad adicional contenida en este folleto y hable sobre esto con su médico.

 **AVMAPKI® FAKZYNJA® CO-PACK**
(avutometinib capsules; defactinib tablets) 0.8 mg; 200 mg

Cómo tomar Avmapki Fakzynja Co-Pack (continuación)

Avmapki  | Fakzynja 

	Hora	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
Semanas 1, 2 y 3	En la mañana a la misma hora	 + 			 + 			
	En la noche							
Semana 4	REPOSO DE UNA SEMANA. No tome Avmapki Fakzynja Co-Pack durante la semana 4.							

Las imágenes del producto que se muestran no ilustran el tamaño real.

Cuando tome Avmapki Fakzynja Co-Pack

- Debe tomarlo exactamente como se lo indique el profesional de la salud y no debe cambiar la dosis ni dejar de tomarlo sin consultar antes con dicho profesional.
- Si presenta determinados efectos secundarios, el profesional de la salud puede modificar la dosis, interrumpir de manera temporal el tratamiento o suspenderlo por completo. Hable con el profesional de la salud sobre los efectos secundarios que presente mientras tome Avmapki Fakzynja Co-Pack.
- Asegúrese siempre de mantener Avmapki Fakzynja Co-Pack y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Si vomita después de tomar Avmapki o Fakzynja

- No tome otra dosis.
- Tome la siguiente dosis programada según lo indicado por el profesional de la salud.

Si toma antiácidos

- Asegúrese de tomar los comprimidos de Fakzynja 2 horas antes o 2 horas después de tomar los antiácidos.

Si olvida tomar una dosis de Avmapki durante más de 24 horas

Si olvida una dosis de Fakzynja durante más de 6 horas

- Omita la dosis que olvidó y tome la siguiente dosis programada según lo indicado por el profesional de la salud.
- No tome 2 dosis al mismo tiempo para compensar una dosis que olvidó tomar.

Consulte la información importante de seguridad adicional contenida en este folleto y hable sobre esto con su médico.

 **AVMAPKI® FAKZYNJA® CO-PACK**
(avutometinib capsules; defactinib tablets) 0.8 mg; 200 mg

Información importante de seguridad

Avmapki Fakzynja Co-Pack puede causar efectos secundarios serios, como problemas en los ojos, reacciones cutáneas graves, problemas hepáticos y problemas musculares, como rabdomiólisis. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Avmapki Fakzynja Co-Pack. Consulte al profesional de la salud para que la asesore sobre los efectos secundarios.

Con la orientación de los profesionales de la salud, el 84 % de las mujeres tuvo una mejoría de los efectos secundarios al suspender la dosis y el 44 % presentó mejorías al reducir la dosis, mientras que el 14 % interrumpió el tratamiento.


Antes del tratamiento y durante su transcurso, el profesional de la salud le entregará lo siguiente:



- Corticoesteroide tópico para aplicarse en la cara, el cuero cabelludo, el cuello, la parte superior del pecho y la parte superior de la espalda para ayudar a prevenir reacciones cutáneas.



- Antibióticos para tomar por vía oral y prevenir de forma complementaria las reacciones cutáneas.



Limite el tiempo de exposición al sol

Puede que Avmapki Fakzynja Co-Pack le cause sensibilidad al sol y a la luz de las lámparas solares y las camas de bronceado.

- Puede que se queme con mayor facilidad y sufra quemaduras solares graves.
- Asegúrese de aplicarse diariamente protector solar con un factor de protección solar (FPS) superior a 30.
- Use sombrero y ropa que le cubra la piel para protegerse de las quemaduras solares.
- Si sufre una quemadura solar, infórmele al profesional de la salud.

Información importante de seguridad (continuación)



Avmapki Fakzynja Co-Pack puede causar efectos secundarios serios, entre ellos, los siguientes:

Problemas en los ojos. Los problemas en los ojos son frecuentes al recibir tratamiento con Avmapki Fakzynja Co-Pack y pueden ser graves.

El profesional de la salud la remitirá a un especialista en ojos antes de comenzar el tratamiento, durante el tratamiento y ante el empeoramiento o los problemas nuevos que presente en los ojos. Informe al profesional de la salud si presenta algún empeoramiento o problema nuevo en los ojos, incluidos los siguientes:

- Cambios en la visión, como visión borrosa, visión doble o pérdida de la visión.
- Ojos secos.
- Inflamación de los ojos y los párpados, entre lo que se incluye enrojecimiento, inflamación y picazón.
- Dolor de ojos.
- Moscas volantes nuevas o que han aumentado (pequeñas manchas oscuras o líneas onduladas que se perciben como si estuviesen flotando en el aire).
- Sensación de que la luz daña los ojos o visión con destellos de luz.

Los problemas más frecuentes en los ojos relacionados con el tratamiento fueron cambios en la visión (38 %), como visión borrosa, que por lo general fueron leves o moderados en términos de gravedad.

Reacciones cutáneas graves. Las reacciones cutáneas son frecuentes con Avmapki Fakzynja Co-Pack y pueden ser graves o incluso mortales. Informe al profesional de la salud si presenta una reacción cutánea nueva o si una reacción previa empeora, incluido lo siguiente:

- Erupción cutánea o acné.
- Piel seca.
- Picazón.
- Ampollas en la piel.
- Enrojecimiento o inflamación de la cara, las manos o las plantas de los pies.
- Ampollas o llagas en la boca.
- Descamación de la piel.
- Infección cutánea.

Información importante de seguridad (continuación)

Avmapki Fakzynja Co-Pack puede causar efectos secundarios serios, entre ellos, los siguientes:

Problemas hepáticos. Los problemas hepáticos son frecuentes en el tratamiento con Avmapki Fakzynja Co-Pack y pueden ser graves. El tratamiento con Avmapki Fakzynja Co-Pack puede aumentar la concentración de la aspartato aminotransferasa, la alanina aminotransferasa y la bilirrubina en la sangre. El profesional de la salud le hará un análisis de sangre antes de comenzar cada ciclo de tratamiento y durante el tratamiento para comprobar la función hepática. Informe al profesional de la salud si presenta algún signo o síntoma de problemas hepáticos graves, entre ellos, los siguientes:

- Tono amarillento en la piel o en la parte blanca de los ojos.
- Picazón en la piel.
- Mucho cansancio.
- Síntomas parecidos a los de la gripe.
- Náuseas o vómitos.
- Dolor en la parte superior derecha del estómago.
- Orina turbia u oscura.
- Aparición de sangrado o moretones con mayor facilidad de lo normal.

Problemas musculares (rabdomiólisis). Avmapki Fakzynja Co-Pack puede causar problemas musculares que pueden ser graves. El tratamiento con Avmapki Fakzynja Co-Pack puede aumentar la concentración de una enzima en la sangre llamada "creatina fosfocinasa (CPK)" y esto puede ser un signo de daño muscular. El profesional de la salud le hará un análisis de sangre antes de comenzar cada ciclo de tratamiento y durante el tratamiento para comprobar la concentración de la CPK. Informe al profesional de la salud si presenta algún signo o síntoma de concentración elevada de la CPK, entre ellos, los siguientes:

- Debilidad o dificultad para mover los brazos y las piernas.
- Dolores persistentes en los músculos o los huesos.
- Orina turbia o rojiza, o disminución de la producción de orina.

Información importante de seguridad (continuación)

Entre los efectos secundarios más frecuentes de Avmapki Fakzynja Co-Pack se incluyen los siguientes:

- Náuseas.
- Cansancio.
- Aumento de la aspartato aminotransferasa.
- Diarrea.
- Inflamación en el cuerpo (edema).
- Disminución de la hemoglobina.
- Aumento de la alanina aminotransferasa.
- Vómitos.
- Aumento de la bilirrubina en la sangre.
- Aumento de triglicéridos.
- Dolor en la zona del estómago.
- Reflujo gastroesofágico.
- Aumento de la fosfatasa alcalina.
- Disminución de plaquetas.
- Estreñimiento.
- Falta de aliento.
- Tos.
- Infección urinaria.
- Disminución de linfocitos.
- Disminución de neutrófilos.
- Proteinuria.

Los efectos secundarios más frecuentes de Avmapki Fakzynja Co-Pack fueron leves o moderados en términos de gravedad, y el 14 % de las mujeres presentaron efectos secundarios que las obligaron a interrumpir el tratamiento.

Avmapki Fakzynja Co-Pack puede causar problemas de fertilidad tanto en mujeres como en hombres, lo que puede afectar su capacidad para tener hijos. Si esto le preocupa, hable con el profesional de la salud.

Informe al profesional de la salud si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Avmapki Fakzynja Co-Pack. Consulte al profesional de la salud para que la asesore sobre los efectos secundarios.

Se recomienda informar a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Ingrese a www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.



Verastem Cares™

Un programa de apoyo diseñado para usted

Reciba asistencia personalizada en todo momento.

Verastem Cares™ ayuda a las mujeres que reciben tratamiento con Avmapki Fakzynja Co-Pack o que están a punto de comenzar el tratamiento. Ya sea que tenga preguntas, necesite ayuda o busque recursos durante el tratamiento, estamos aquí para ayudarla a lo largo del proceso con Avmapki Fakzynja Co-Pack.

Nuestro programa de apoyo está diseñado para ayudar tanto a las mujeres como a los profesionales de la salud a acceder al tratamiento con Avmapki Fakzynja Co-Pack. Independientemente del seguro que tenga, o si no tiene ningún seguro, Verastem Cares™ tiene programas para brindarle apoyo.



Seguro comercial

El programa de copago de Verastem puede cubrir sus gastos de bolsillo del tratamiento con Avmapki Fakzynja Co-Pack. Puede llegar a pagar tan solo \$0.*



Medicare, Medicaid o seguro militar

Podemos ponerla en contacto con fundaciones y organizaciones independientes que pueden ayudarla a afrontar los costos de los medicamentos y ofrecerle otros recursos.



¿No tiene seguro o su seguro es insuficiente para Avmapki Fakzynja Co-Pack?

Si no tiene seguro médico o su plan de salud no cubre Avmapki Fakzynja Co-Pack, puede que aún reúna los requisitos para acceder a otras opciones de medicamentos gratuitos.†



¿Sufre retrasos en el tratamiento relacionados con el seguro médico?

Si los retrasos relacionados con el seguro le impiden iniciar la terapia o corre el riesgo de que esta se interrumpa, puede que sea elegible para recibir un suministro temporal gratuito de Avmapki Fakzynja Co-Pack mientras el profesional de la salud intenta resolver los problemas del seguro.

*El programa de copago está sujeto a un límite máximo de beneficios anuales.

†Se aplican las normas de elegibilidad del Programa de Asistencia al Paciente.

Verastem Cares™

Un programa de apoyo diseñado para usted (continuación)



Qué esperar si le recetan Avmapki Fakzynja Co-Pack

El profesional de la salud trabajará con usted para encontrar la mejor manera de obtener su receta médica, y Verastem Cares™ puede ayudarla y responder sus preguntas sobre el proceso de recepción de su medicamento.



VERASTEM
CARES™

Nuestro equipo especializado está listo para ayudarla.

Para obtener más información y recursos útiles sobre las opciones de acceso y apoyo, llame hoy mismo al

866-351-8372

de 8:00AM a 8:00PM hora del Este, de lunes a viernes

Consulte la información importante de seguridad adicional contenida en este folleto y hable sobre esto con su médico.

 **AVMAPKI® FAKZYNJA® CO-PACK**
(avutometinib capsules; defactinib tablets) 0.8 mg; 200 mg

REIMAGINA LO POSIBLE

Se ha demostrado que Avmapki Fakzynja Co-Pack es una opción de tratamiento útil con efectos secundarios manejables.



Obtenga más información:

Escanee el código QR o visite
www.AvmapkiFakzynjaCo-Pack.com

Conéctese con grupos de defensa de los pacientes.

No está sola en su lucha contra el LGSOC recurrente con mutación del gen *KRAS*. Merece sentirse apoyada, empoderada e informada a lo largo de todo el proceso. A continuación, encontrará 2 organizaciones destacadas de defensa del paciente que apoyan a las personas afectadas por el LGSOC.

Not These Ovaries

www.nottheseovaries.org

STAAR Low-Grade Serous

Ovarian Cancer Foundation

www.staaroc.org

Los sitios web antes mencionados se proporcionan únicamente con fines informativos. Verastem no controla ni respalda el contenido de sitios externos y no es responsable de su exactitud ni de su disponibilidad.

Consulte la información importante de seguridad adicional contenida en este folleto y hable sobre esto con su médico. Haga clic aquí para leer la [Información de receta](#) y la [Información para la paciente en español](#) completas. Haga clic aquí para leer la [Información de receta](#) y la [Información para la paciente en inglés](#) completas.



©2026 Verastem, Inc. Todos los derechos reservados.

AF-US-2026-0044 09/26

Avmapki y Fakzynja son marcas registradas de Verastem, Inc.

Verastem Cares es una marca registrada de Verastem, Inc.

Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Para pacientes y cuidadores estadounidenses mayores de 18 años.



AVMAPKI® FAKZYNJA® CO-PACK
(avutometinib capsules; defactinib tablets) 0.8 mg; 200 mg

